

開豊瓊玉膏

【複方地黄人参蒸】

第2類医薬品

【製品の特徴】 瓊玉膏は生地黄の搾汁、人参末、ブクリョウ末、枸杞子末、沈香末、ハチミツを混合し、二重蒸気釜で蒸熱したのち、徐々に冷却させて製品としました。
瓊玉膏は、黒褐色、軟エキス様の独特の香りを持ち、甘味と多少の苦味を持った生薬製剤です。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

- 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢

【効能・効果】 次の場合の滋養強壮
食欲不振、肉体疲労、虚弱体質、病後の体力低下、胃腸虚弱、血色不良、冷感性、発育期

【用法・用量】 成人 …………… 茶匙 1杯量(約5g)
11才以上15才未満 …………… 茶匙 2/3量
8才以上11才未満 …………… 茶匙 1/2量
8才未満の小児 …………… 服用しないこと
そのまま、または温湯でうすめて1日1～2回服用する。
なお、添付の茶匙すりきり1杯で約5gです。

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 本剤の特性上、製品により色、味、固さに多少の差異を生じることがありますが、効能・効果に変わりありません。よくかきまぜてから服用してください。

【成分・分量】 本品100g中
 生地黄の搾汁 …………… 32.0g
 人参末 …………… 2.8g
 ブクリョウ末 …………… 8.0g
 添加物としてパラオキシ安息香酸プロピルを含有する。
 枸杞子末 …………… 0.9g
 沈香末 …………… 0.1g
 ハチミツ …………… 38.5g

【保管及び取扱い上の注意】

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に密栓して保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 服用に使用した茶匙は、清潔に保つようにしてください。
- 服用後のビンには、割れることがありますので熱いお湯で洗わないでください。

【お客様相談窓口】 株式会社 栃本天海堂 品質保証部・品質保証課
 電話番号 06-7711-0730
 メールアドレス customer@tochimoto.co.jp
 受付時間 10時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

【製造販売元】 株式会社 栃本天海堂
 大阪市北区末広町3番21号

【製 造】 廣東製藥株式會社
 大韓民国製