

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

ろくみがん トチモトの 六味丸

「六味丸」は、漢方の古書「小児方訣」に記載されている漢方処方「六味地黄丸」を基本に6種の生薬末を合わせ、ハチミツを加え丸剤としたものです。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

疲れやすくて尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：
排尿困難、頻尿、むくみ、かゆみ

【用法・用量】

15才以上 1回20丸、1日3回、食前又は食間に服用
15才未満の小児：服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。
食間とは、食後2～3時間を指します。

【成分・分量】

本品1日量（60丸、6,000mg）中

ジオウ末・・・1,200mg

サンシュユ末・・・600mg

日本薬局方 サンヤク末・・・600mg

日本薬局方 タクシャ末・・・450mg

日本薬局方 ブクリョウ末・・・450mg

日本薬局方 ボタンピ末・・・450mg

添加物としてコメデンプン、ハチミツを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤はハチミツを入れて製丸していますので、容器中で丸剤どうしがくっつくことがあります。薬効には変わりありませんので、軽く振ってご使用ください。
- (5) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります。効果には変わりありません。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

■お客様相談窓口

株式会社 栃本天海堂 品質保証部・品質保証課

TEL 06-7711-0730

メールアドレス customer@tochimoto.co.jp

受付時間 10時～17時まで(土、日、祝日を除く)

株式会社 栃本天海堂 大阪市北区末広町3番21号